

پایه هفتم

۱ آموزش و تمرین

در این بخش، مطالب کتاب درسی به طور قدم به قدم تدریس شده است. هدف این قسمت صرفاً آموزش در حد کتاب درسی و آزمون‌های تشریحی مدارس است، لذا در این بخش از بیان مطالبی که خارج از این چارچوب هستند پرهیز شده است و دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند مطالب بیشتر را در بخش سوم این کتاب (بخش نکته و تست) مطالعه کنند.

در این بخش مطالب به صورت صفحه به صفحه آموزش داده می‌شود. در هر صفحه مطالبی آموزش داده می‌شود و مثال‌هایی را حل می‌کند و سپس چند نمونه تمرین از مطالب گفته شده ارائه می‌کند. از دانش‌آموز خواسته شده بعد از پاسخ دادن به آن تمرین‌ها پاسخ خود را با پاسخ کتاب مقایسه کند. بعد از آموزش هر درس، تمرینات مروری آن درس را می‌بینید که شامل نمونه سوالات متنوع امتحانی است و دانش‌آموز را با قالب‌های مختلف سوالات امتحانی آشنا می‌کند و انجام دادن آنها برای تعمیق و تثبیت آموزش لازم و ضروری است. در پایان هر فصل آزمونی برای جمع‌بندی مطالب آن فصل طراحی شده است. پاسخنامه تشریحی تمامی سوال‌ها و تمرین‌ها در انتهای این بخش قرار دارد.

۳۴۲ پاسخنامه

۲ آزمون

چند نمونه آزمون نوبت اول و دوم با بودجه‌بندی و بارم‌بندی استاندارد آموزش و پوشش در این بخش آمده است. خواندن این بخش را برای ایام نزدیک به امتحانات یا به قول معروف «شب امتحان» توصیه می‌کنیم. پاسخنامه آزمون همراه با ریز بارم در انتهای این بخش قرار دارد.

۳۵۴ پاسخنامه

۳ نکته و تست

در این بخش نکات و مطالب تکمیلی کتاب درسی بیان شده است، که یادگیری آنها برای دانش‌آموزان سخت‌کوش و علاقه‌مند بسیار مفید و لذت‌بخش است، همچنین نمونه تست‌های متنوع در سطح‌های دشواری متفاوت به همراه پاسخ تشریحی آنها در این بخش ارائه شده است.

دانش‌آموزانی که مطالب بخش آموزش و تمرین را خوب آموخته‌اند و در انجام تمرین‌های تشریحی آن مشکلی ندارند، بدون تردید با مطالعه و حل تست‌های این بخش لذت یادگیری ریاضی در سطح فراتر از کلاس و کتاب درسی را به خوبی تجربه خواهند کرد. البته این دانش‌بیشتر و کسب مهارت تست‌زنی در سال‌های آتی و آزمون‌های خاص بسیار کمک حال آنها خواهد بود. پاسخنامه تشریحی بخش نکته و تست در انتهای این بخش قرار دارد.

۴۴۷ پاسخنامه

۴ فیلم‌های آموزشی

این کتاب شامل ۲۶ ساعت **فیلم آموزشی** است که در این فیلم‌ها مطالب کتاب درسی به صورت کامل آموزش داده شده و تمامی تمرین‌ها و سوال‌های کتاب درسی حل و تشریح شده است. برای مشاهده این فیلم‌ها کافی است کدهای QR را که در صفحه ورودی هر فصل قرار دارد، اسکن کنید.

فهرست محتوا

فصل ۱	جلسه ۱۵: یادآوری پایه ششم جلسه ۱۶: چگونگی حل مسئله جلسه ۱۷: راهبرد رسم شکل جلسه ۱۸: راهبرد الگوسازی جلسه ۱۹: راهبرد حذف حالت های نامطلوب جلسه ۲۰: راهبرد الگویابی جلسه ۲۱: راهبرد حدس و آزمایش جلسه ۲۲: راهبرد زیرمسئله جلسه ۲۳: راهبرد حل مسئله ساده تر جلسه ۲۴: راهبرد روش های نمادین جلسه ۲۵: مرور راهبردها
فصل ۲	جلسه ۲۶: معرفی عددهای علامت دار جلسه ۲۷: جمع و تفریق عددهای صحیح (۱) جلسه ۲۸: جمع و تفریق عددهای صحیح (۲) جلسه ۲۹: ادامه جمع و تفریق عددهای صحیح (۲) جلسه ۳۰: ضرب و تقسیم عددهای صحیح
فصل ۳	جلسه ۳۱: الگوهای عددی جلسه ۳۲: عبارت های جبری جلسه ۳۳: ادامه عبارت های جبری جلسه ۳۴: مقدار عددی یک عبارت جبری جلسه ۳۵: ادامه مقدار عددی یک عبارت جبری جلسه ۳۶: معادله
فصل ۴	جلسه ۳۷: ادامه معادله جلسه ۳۸: روابط بین پاره خط ها جلسه ۳۹: ادامه روابط بین پاره خط ها جلسه ۴۰: روابط بین زاویه ها
فصل ۵	جلسه ۴۱: ادامه روابط بین زاویه ها جلسه ۴۲: تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران) جلسه ۴۳: ادامه تبدیلات هندسی جلسه ۴۴: شکل های مساوی (همنهشت)
فصل ۶	کدهای QR فیلم های آموزشی هر فصل به صورت جلسه به جلسه در صفحه ورودی آن فصل قرار دارد.



آموزش و تمرین ...

مجموعه کتابهای
سیر تا پیاز



صفحه ۱۰	راهبرد رسم شکل.
صفحه ۱۱	راهبرد الگویسازی یا تفکر نظامدار.
صفحه ۱۲	راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب.
صفحه ۱۳	مرور درس.
صفحه ۱۵	راهبرد الگویابی (عددی)
صفحه ۱۶	راهبرد الگویابی (هندسی)
صفحه ۱۷	راهبرد حدس و آزمایش
صفحه ۱۸	مرور درس.
صفحه ۲۰	راهبرد زیرمسئله.
صفحه ۲۱	راهبرد حل مسئله ساده‌تر.
صفحه ۲۲	راهبرد روش‌های نمادین
صفحه ۲۳	مرور درس.
صفحه ۲۵	آزمون فصل اول.
صفحه ۲۳۲	پاسخنامه.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی اسکن کنید.



جلسه صفر: یادآوری پایه ششم



جلسه اول: چگونگی حل مسئله،
راهبرد رسم شکل، راهبرد الگویسازی



جلسه دوم: راهبرد حذف حالت‌های
نامطلوب، راهبرد الگویابی، راهبرد
حدس و آزمایش، راهبرد زیرمسئله



جلسه سوم: راهبرد حل مسئله ساده‌تر،
راهبرد روش‌های نمادین، مرور راهبردها

راهبرد رسم شکل

بسیاری از مسئله‌ها را با رسم یک شکل مناسب، یا به طور مستقیم باعث حل مسئله می‌شود، یا باعث درک بیهتر مسئله شده و به حل آن کمک می‌کند؛ به طوری که نیازی به نوشتن عملیات و محاسبه نباشد گاهی ممکن است شکل را فقط تصور کنید و آن را رسم نکنید. منظور از رسم شکل، نقاشی نیست؛ بلکه می‌توانید برای این کار شکل‌های ساده بکشید.


مثال: دو خط راست و دو دایره حداکثر چند نقطه تقاطع دارند؟



پاسخ: ابتدا دو دایره که همدیگر را حداکثر در دونقطه قطع می‌کنند، رسم کرده و سپس دو خط را طوری رسم می‌کنیم که این دایره‌ها را در بیشترین نقطه قطع کنند. پس بیشترین نقطه برخورد ۱۱ نقطه می‌باشد.

مثال: $\frac{1}{3}$ ظرفی پراز آب است. اگر 30° لیتر آب داخل ظرف بروزیم، تا نیمه پرمی شود. گنجایش ظرف چند لیتر است؟

پاسخ: با توجه به شکل، مقدار آبی که داخل ظرف می‌ریزیم $\frac{1}{6}$ از گنجایش ظرف است که برابر 30° لیتر است، پس کل گنجایش ظرف برابر است با:



۳ در یک مسیر 10° ایستگاه اتوبوس با فاصله یکسان قرار دارند.

فاصله بین ایستگاه اول تا ایستگاه سوم 60° متر است. فاصله بین ایستگاه اول تا دهم چقدر است؟

تمرین‌های زیر را حل، و پاسخ خود را با پاسخ صفحه ۲۳۲ مقایسه کنید.

۱ $\frac{2}{3}$ از $\frac{4}{5}$ راهی 2° کیلومتر است. کل راه چند کیلومتر است؟

۲ در یک مزرعه 12° مرغ و اسب وجود دارد. اگر تعداد پاهای آنها روی هم 32° باشد، در این مزرعه چند مرغ و چند اسب وجود دارد؟

۲ باغبانی می‌خواهد ۵ ردیف گل و در هر ردیف، ۴ شاخه گل داشته باشد. او حداقل به چند شاخه گل نیاز دارد؟


راهبرد الگوسازی یا تفکر نظام دار

برای رسیدن به پاسخ بعضی مسائل نیاز است که همه **حالت های ممکن** را بنویسیم. در این صورت باید با **نظارتی منطقی** و براساس **الگویی مناسب**، همه حالت های ممکن را طوری بنویسیم که هیچ **حالتی** از قلم **نیفتند** و هیچ **حالتی تکراری** نباشد. بنابراین در مسئله هایی که لازم است همه جواب ها و پاسخ های ممکن را بنویسید، می توانید از این راهبرد استفاده کنید.

مثال: چند مستطیل مختلف وجود دارد که مساحت هر کدام 30 واحد مربع باشد؟ (طول و عرض مستطیل اعداد طبیعی هستند).

عرض	طول	مساحت
1	30	$1 \times 30 = 30$
2	15	$2 \times 15 = 30$
3	10	$3 \times 10 = 30$
5	6	$5 \times 6 = 30$

پاسخ: باید طول و عرض مستطیل را طوری انتخاب کنیم که حاصل ضرب آنها 30 باشد. چون کوچکترین عدد طبیعی 1 است، برای نوشتن همه حالت ها از 1 شروع می کنیم. با توجه به جدول، چهار مستطیل مختلف ممکن رسم کرد که مساحت هر یک از آنها 30 واحد مربع باشد. توجه داشته باشید که طول و عرض ها را نمی توانیم اعشاری انتخاب کنیم.



مثال: در شش ضلعی مقابل تعداد قطرها را با نوشتن نام آنها به دست آورید.

پاسخ: برای اینکه قطری از قلم نیفتند یا قطری را بیش از یک بار نشماریم، با استفاده از یک جدول و راهبرد الگوسازی همه قطرها را می نویسیم و می شماریم. برای این کار ابتدا قطرهایی را که از رأس A، سپس رأس B و الی آخر کشیده می شود، می نویسیم.

از رأس A	از رأس B	از رأس C	از رأس D
AC - AD - AE	BD - BE - BF	CE - CF	DF

بنابراین شش ضلعی 9 قطر دارد.

۷ با اسکناس های 500 ، 1000 و 2000 تومانی به چند حالت

تمرین های زیر را حل، و پاسخ خود را با پاسخ صفحه ۲۳۲ مقایسه کنید.

می توان 5000 تومان پول پرداخت کرد؟

۵ تمام عدد های سه رقمی را که با سه رقم 2 ، 6 و 9 می توان ساخت

بنویسید. (بدون تکرار ارقام)

۸ دو عدد طبیعی بنویسید که حاصل ضرب آنها 36 و حاصل جمع آنها کمترین مقدار ممکن باشد.

۶ به چند حالت می توان با انگشتان یک دست عدد 3 را نشان داد؟

راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب

برای حل برخی مسئله‌ها که حالت‌های مختلفی برای پاسخ دارند، ممکن است نتوانیم در **گام اول** به طور مستقیم به پاسخ مسئله (**حالت مطلوب**) برسیم؛ بنابراین ابتدا به کمک **راهبرد الگوسازی** همه حالت‌های ممکن را برای پاسخ آن مسئله می‌نویسیم، سپس با توجه به شرایط مسئله، حالت‌های **نامطلوب** را حذف می‌کنیم تا به حالت مطلوب (**پاسخ**) برسیم.

مثال: اندازه طول و عرض مستطیلی عدددهای طبیعی و مساحت آن ۳۶ سانتی‌مترمربع است. کمترین مقدار برای محیط این مستطیل چند سانتی‌متر است؟

عرض	طول	محیط
۱	۳۶	$(1+36) \times 2 = 74$
۲	۱۸	$(2+18) \times 2 = 40$
۳	۱۲	$(3+12) \times 2 = 30$
۴	۹	$(4+9) \times 2 = 26$
۶	۶	$(6+6) \times 2 = 24 \checkmark$

پاسخ: ابتدا طول و عرض همه مستطیل‌هایی را که مساحت آنها ۳۶ سانتی‌مترمربع می‌شود می‌نویسیم، سپس محیط آنها را حساب می‌کنیم. مستطیلی که محیط آن کمترین مقدار باشد، مطلوب مسئله است. در اینجا، ۵ حالت وجود دارد که مساحت مستطیل ۳۶ سانتی‌مترمربع است که ۴ حالت آن نامطلوب است و کمترین مقدار برای محیط این است که طول و عرض هر دو برابر ۶ سانتی‌متر باشد:

مثال: پایخت کشور سوئیس کدام گزینه است؟

۱) آلب

۲) بون

۳) قاهره

پاسخ: گزینه «۳»

بررسی سایر گزینه‌ها:

- ۱) نمی‌تواند جواب درست باشد، چون یک شهر آفریقایی است و سوئیس یک کشور اروپایی است.
- ۲) نمی‌تواند جواب باشد زیرا بوتان یک کشور آسیایی است.
- ۴) نام رشته کوهی در قاره اروپاست.

۱۱) در یک مسابقه تیراندازی امتیازهای روی صفحه هدف، ۲، ۴، ۶ و ۱۰ می‌باشد، پارسا در این مسابقه ۳ تیر را به هدف زده است. کدام‌یک از اعداد ۱۵، ۲۲، ۸، ۲۱، ۳۴ می‌تواند مجموع امتیازهای پارسا باشد؟

تمرین‌های زیررا حل، و پاسخ خود را با پاسخ صفحه ۲۳۲ مقایسه کنید.

۱۲) مجموع سن سه نفر ۱۴ سال و حاصل ضرب سن آنها ۳۶ است. اختلاف سن بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین نفر چند سال است؟

۱۳) اگر دو ضلع از مثلثی ۵ و ۹ باشند، اندازه ضلع سوم کدام‌یک از اعداد ۱۳، ۸، ۴، ۳ و ۱۵ می‌تواند باشد؟

۱۴) کدام‌یک از اعداد زیر می‌تواند مجموع زاویه‌های داخلی یک چندضلعی منتظم باشد؟

88° , 120° , 226° , 198°

مرور درس

۱۳. هواپیمایی در ارتفاع ۴۵۰ متری از سطح زمین و هواپیمای دیگری در ارتفاع ۲۳۰ متر پایین‌تر از هواپیمای اول در حال پرواز است. ارتفاع هواپیمای دوم از سطح زمین چقدر است؟

۱۴. رضا در یک کیسه تعدادی مهره دارد. نصف مهره‌ها را به علی و یک‌سوم باقیمانده مهره‌ها را به جواد می‌دهد و ۶ مهره اضافه می‌آورد. او در این کیسه چند مهره داشته است؟

۱۵. امیر در ساختمانی که ۱ طبقه روی همکف دارد، مشغول به کار است. او کار خود را از طبقه دوم شروع کرد، سپس ۳ طبقه بالا و بعد از آن ۳ طبقه دیگر بالا رفت. در آخر از آنجا ۸ طبقه پایین آمد و کارش تمام شد. کار امیر در کدام طبقه تمام شده است؟

۱۶. مشهدی تقی سیب‌هایی را که از یک درخت چیده بود، در دسته‌های دوتایی قرار داد و یک سیب اضافه آمد. او سیب‌ها را در دسته‌های پنج‌تایی قرار داد و ۴ سیب اضافه آمد. ولی وقتی او سیب‌ها را در دسته‌های هفت‌تایی قرار داد، سیبی اضافه نیامد. حساب کنید مشهدی تقی حداقل چند سیب چیده بود؟

۱۷. $\frac{1}{3}$ بچه‌های مدرسه‌ای به اردو رفتند. $\frac{5}{6}$ بچه‌هایی که در مدرسه مانده‌اند، در حیاط مشغول بازی هستند و فقط ۶ نفر در کلاس‌های درس مانده‌اند. این مدرسه چند دانش‌آموز دارد؟

۱۸. کرمی از پایین یک دیوار ۹ متری، هر ساعت ۳ متر بالا می‌رود و ۱ متر به پایین سُر می‌خورد. چند ساعت طول می‌کشد تا کرم به بالای دیوار برسد؟

۱۹. علی، مجید، اصغر، رضا و احمد در یک مسابقه دوی ۵۰ متر شرکت کردند. در پایان، اصغر ۳ ثانیه زودتر از مجید و ۳ ثانیه دیرتر از علی، رضا ۷ ثانیه زودتر از احمد و اصغر ۱ ثانیه دیرتر از احمد به خط پایان رسیدند.

الف) آنها با چه ترتیبی مسابقه را تمام کردند؟

ب) اختلاف زمان اولین نفر و آخرین نفر را حساب کنید.

۲۰. لیلا مقداری پول در قلک خود دارد و می‌داند که فقط اسکناس‌های ۱۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ تومانی داخل آن است. همه حالت‌هایی را که ممکن است مجموع پول‌های او ۲۵۰۰۰ تومان شود، بنویسید.

۲۱. مجموع دو عدد طبیعی 10 و حاصل ضرب آنها بیشترین مقدار ممکن است. آن دو عدد را بباید.

۲۲. با رقمهای $4, 5$ و 7 :

الف) چند عدد سه رقمی بدون تکرار می‌توان نوشت؟

ب) چند عدد سه رقمی بزرگ‌تر از 547 می‌توان نوشت؟

۲۳. اگر با چهار کارت که روی هر یک از آنها یکی از اعداد $0, 3, 7$ و 8 نوشته شده است، همه اعداد سه رقمی بخش بذیر بر 5 را بسازیم، چند عدد به دست می‌آید؟ همه آنها را بنویسید.

۲۴. با انگشتان یک دست به پنج صورت می‌توان عدد 1 را نشان داد. به چند صورت می‌توان عدد چهار را نشان داد؟

۲۵. در بین عددهای مقابل، چند عدد وجود دارد که شامل رقم 7 نیست؟

۲۶. مجموع سن سه نفر 36 سال و حاصل ضرب سن آنها 66 سال است. سن بزرگ‌ترین نفر چقدر است؟

۲۷. در یک مسابقه تیراندازی امتیازهای روی صفحه هدف $4, 10, 12$ و 16 است. پارسا در این مسابقه 3 تیر را به هدف زده است. کدامیک از اعداد $38, 42, 27, 44, 50, 34$ روبرو می‌تواند مجموع امتیازهای پارسا باشد؟

۲۸. نازنین یک عدد حسابی کوچک‌تر از 50 را در نظر گرفت. مریم باید با طرح حداقل 6 سؤال، عدد مورد نظر او را پیدا کند. البته او می‌داند که نازنین فقط می‌تواند به سوال‌ها پاسخ «بله» یا «خیر» بدهد. به مریم کمک کنید روشی برای طرح سوال‌ها پیدا کند که با نظم و ترتیبی مشخص، عدد مورد نظر نازنین را به دست آورد.

فصل اول



۶) انگشتان یک دست را از ۱ تا ۵ شماره‌گذاری می‌کنیم و با نظم، از انگشت شماره ۱ شروع می‌کنیم و همه حالت‌هایی که عدد ۳ را می‌توان نشان داد، می‌نویسیم (تکراری‌ها حذف می‌شود).

اولین انگشت	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۲	۲	۳
دومین انگشت	۲	۲	۲	۳	۳	۴	۳	۳	۴	۴
سومین انگشت	۳	۴	۵	۴	۵	۵	۴	۵	۵	۵

به ۱۰ حالت مختلف می‌توان نشان داد.

۷) همه حالت‌های ممکن را با نظم می‌نویسیم. ابتدا از حداقل تعداد اسکناس‌های ۲۰۰۰ تومانی که می‌توان استفاده کرد شروع می‌کنیم. سپس در مراحل بعد به جای هر اسکناس ۱۰۰۰ تومانی دو تا اسکناس ۵۰۰ تومانی قرار می‌دهیم.

سکه ۲۰۰۰ تومانی	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰
سکه ۱۰۰۰ تومانی	۱	۰	۳	۲	۱	۰	۵	۴	۳	۲
سکه ۵۰۰ تومانی	۰	۲	۰	۲	۴	۶	۰	۲	۴	۶

بنابراین ۱۲ حالت وجود دارد.

۸) تمام حالت‌هایی که ضرب دو عدد طبیعی ۳۶ می‌شود را نوشته و کمترین حاصل جمع را انتخاب می‌کنیم.

عدد اول	۱	۲	۳	۴	۶
عدد دوم	۳۶	۱۸	۱۲	۹	۶
جمع	۳۷	۲۰	۱۵	۱۳	۱۲

بنابراین دو عدد طبیعی مورد نظر ۶ و ۶ است.

۹) همه حالت‌هایی را که ضرب سه عدد طبیعی، ۳۶ می‌شود می‌نویسیم، سپس در هر حالت مجموع هرسه‌تایی را حساب می‌کنیم:


نفر اول	نفر دوم	نفر سوم	مجموع
۱	۱	۳۶	۳۸
۱	۲	۱۸	۲۱
۱	۳	۱۲	۱۶
۱	۴	۹	۱۴
۱	۶	۶	۱۳
۲	۲	۹	۱۳
۲	۳	۶	۱۱
۳	۳	۴	۱۰

با توجه به جدول، حالت مطلوب ۴، ۹ و ۱۳ است.

۹-۱=۸ اختلاف سن بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین نفر


راهبردهای حل مسئله

۱) ابتدا کل مسیر را بیکاره خط نشان می‌دهیم سپس آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده و هریک از این قسمت‌ها را نیز به سه قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم:



طبق شکل $\frac{2}{3}$ از $\frac{1}{4}$ مسیر، $\frac{1}{12}$ کل مسیر است که برابر ۲۰ کیلومتر است
پس ۶ قسمت $20 \text{ km} = 120 \text{ km}$ برابر ۱۲۰ کیلومتر داریم، بنابراین:

۲) در اینجا با رسم یک شکل، به پاسخ می‌رسیم. برای اینکه در این پنج ردیف، حداقل شاخه گل به کار ببریم باید بیشترین نقطه برخورد را داشته باشد.



۳) با توجه به شکل از ایستگاه اول تا ایستگاه سوم، ۲ فاصله ۳۰۰ متری وجود دارد، پس از ایستگاه اول تا دهم ۹ فاصله ۳۰۰ متری وجود دارد.




۴) ابتدا همه حیوانات مزرعه را مرغ در نظر می‌گیریم و هر مرغ که دو پا دارد را به صورت نشان می‌دهیم که در این حالت تعداد پاها $2 \times 12 = 24$ ، اما تعداد پاها باید ۳۲ شود، چون هراسب ۴ پا دارد، پس به هر شکل ۲ پا اضافه می‌کنیم تا تعداد پاها ۳۲ شود. به این ترتیب ۸ مرغ و ۴ اسب خواهیم داشت.



۵) ابتدا اعدادهای سه رقمی با صدگان، ۶ و سپس با صدگان ۲ را می‌نویسیم.

شش عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می‌توان نوشت.

یکان	دهگان	صدگان
۹	۶	۲
۹	۲	۶
۶	۹	۲
۶	۲	۹
۲	۹	۶
۲	۶	۹




۱۵. از راهبرد رسم شکل استفاده می‌کنیم.
کار او در طبقه همکف تمام می‌شود.

۱۶. چون با قرار دادن سیب‌ها در دسته‌هایی هفت‌تایی هیچ سیبی اضافه نمی‌آید، تعداد سیب‌ها بر ۷ بخش پذیر است. پس عددهایی را که بر ۷ بخش پذیر است، در نظر گرفته و سپس با توجه به شرایط مسئله حالت مطلوب را انتخاب می‌کنیم:

تعداد سیب‌ها	۷	۱۴	۲۱	۲۸	۳۵	۴۲	۴۹
با قیمانده بر ۲	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱
با قیمانده بر ۵	۲	۴	۱	۳	۰	۲	۴


کوچک‌ترین عدد برای تعداد سیب‌ها ۴۹ تاست.

۱۷. با استفاده از رسم شکل ابتدا شکل را به سه قسمت تقسیم کرده و $\frac{1}{3}$ آن را رانگ می‌کنیم، سپس با قیمانده را ۶ قسمت کرده و $\frac{5}{6}$ آن را رانگ می‌کنیم. قسمت رنگ‌نشده همان ۶ نفری هستند که در کلاس مانده‌اند.




پس طبق شکل کل کلاس به ۱۸ قسمت سه‌نفره تقسیم می‌شود، پس:
تعداد دانش‌آموزان $= 18 \times 3 = 54$

۱۸. طبق راهبرد رسم شکل در ۴ ساعت کرم به بالای دیوار می‌رسد.



الف) با استفاده از راهبرد رسم شکل داریم:



ب) نفر اول رضا و نفر آخر مجید بوده است که طبق شکل ۱۱ ثانیه اختلاف زمان داشته‌اند.

۱۰. با توجه به اینکه مجموع زاویه‌های داخلی یک چندضلعی مضربی از 180° است، پس عدد مورد نظر باید بر 180° بخش‌پذیر باشد که سه عدد 88° و 120° و 226° بر 180° بخش‌پذیر نیستند، ولی 198° بر 180° بخش‌پذیر است، پس پاسخ 198° است.

۱۱. عدهای ۱۵ و ۲۱ نمی‌توانند جمع امتیازها باشند، چون امتیاز هر پرتاپ زوج است، مجموع آنها باید زوج باشد، عدد ۳۴ هم نمی‌تواند جمع امتیازها باشد چون اگر پارسا هر سه هدف را ۱۰ امتیاز زده باشد امتیازش بیشتر از ۳۰ نخواهد بود، بنابراین:

$$22 = 10 + 10 + 2 \quad (2\text{ تا }10 \text{ امتیازی} \text{ و یکی } 2 \text{ امتیازی})$$

$$22 = 10 + 6 + 6 \quad (2\text{ تا }6 \text{ امتیازی} \text{ و یکی } 10 \text{ امتیازی})$$

$$8 = 2 + 2 + 4 \quad (2\text{ تا }2 \text{ امتیازی} \text{ و یکی } 4 \text{ امتیازی})$$

۱۲. می‌دانیم در هر مثلث باید مجموع هر دو ضلع از ضلع سوم بزرگ‌تر باشد، پس تمام سه‌تایی‌هایی را که با ۵ و ۹ و یکی از اعداد داده شده می‌توان نوشت را می‌نویسیم و شرط بالا را در هر حالت بررسی می‌کنیم:

$$5, 9, 3 : 5+3 > 9 \quad \times$$

$$5, 9, 4 : 5+4 > 9 \quad \times$$


$$5, 9, 8 : 5+8 > 9, 9+8 > 5, 5+9 > 8 \quad \checkmark$$

$$5, 9, 13 : 5+9 > 13, 5+13 > 9, 13+9 > 5 \quad \checkmark$$

$$5, 9, 15 : 5+9 > 15 \quad \times$$


پس دو حالت (۵, ۹, ۸) و (۱۳, ۹, ۵) می‌توانند اضلاع مثلث باشند.

۱۳. از راهبرد رسم شکل استفاده می‌کنیم:



$$\text{ارتفاع هوایپیمای دوم از سطح زمین} = 4500 - 2300 = 2200 \text{ متر}$$

۱۴. از راهبرد رسم شکل به ترتیب زیر استفاده می‌کنیم:



$$\text{تعداد مهره‌ها} = 6 \times 3 = 18$$



.... آزمون

مجموعه کتابهای
سیر تا پیاز



آزمون

پاسخ سؤال

۳۵۴ ۳۳۵

نوبت اول (۱)

آزمون ۱

۳۵۶ ۳۳۸

نوبت اول (۲)

آزمون ۲

۳۵۸ ۳۴۱

نوبت دوم (۱)

آزمون ۳

۳۶۱ ۳۴۴

نوبت دوم (۲)

آزمون ۴

۳۶۳ ۳۴۸

نوبت دوم (۳)

آزمون ۵

۳۶۵ ۳۵۱




نوبت دوم (۴)

آزمون ۶

زمان آزمون : ۷۵ دقیقه		آزمون نوبت اول	ریاضی
نمره	پایه هفتم	آزمون شماره ۱	
۱	<input type="radio"/> درست <input type="radio"/> نادرست <input type="radio"/> درست <input type="radio"/> نادرست <input type="radio"/> درست <input type="radio"/> نادرست <input type="radio"/> درست <input type="radio"/> نادرست	<p>درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را مشخص کنید.</p> <p>الف) اعداد صحیح منفی از صفر بزرگ‌ترند.</p> <p>ب) از دو نقطه بی‌شمار خط راست می‌گذرد.</p> <p>پ) اگر طول ضلع مثلث متساوی‌الاضلاعی a باشد، عبارت جبری محیط آن $3a$ می‌باشد.</p> <p>ت) تمام اعداد اول، فرد هستند.</p>	۱
۱		<p>جمله‌های زیر را کامل کنید.</p> <p>الف) اگر ضرب دو عدد صحیح صفر شود، حداقل یکی از آنها است.</p> <p>ب) مقدار عددی عبارت $\frac{1-4a}{2a+1}$ به ازای $a = -1$ برابر است با</p> <p>پ) ممتد زاویه 37° برابر است با</p> <p>ت) عدد $a = 2 \times 9 \times 15$ دارای شمارنده اول است.</p>	۲
۱/۲۵		<p>گزینه درست را انتخاب کنید.</p> <p>(الف) حاصل عبارت $[14 + 17 - 5] - [-14]$ برابر است با:</p> <p style="text-align: center;">-۸ (۴○) ۲ (۳○) -۲۶ (۲○) ۲۶ (۱○)</p> <p>(ب) کدام جمله با $3ab$ متشابه است؟</p> <p style="text-align: center;">۳abc (۴○) ۴ab (۳○) ۳b (۲○) ۳a (۱○)</p> <p>(پ) اگر نشان دهنده $+1$ و نشان دهنده -1 باشد، حاصل جمع + + کدام است؟</p> <p style="text-align: center;">+ ۱ (۴○) - ۱ (۳○) - ۵ (۲○) + ۵ (۱○)</p> <p>(ت) در دوران درجه لازم است جهت دوران را مشخص کنیم.</p> <p style="text-align: center;">۳۶۰ (۳○) ۱۸۰ (۲○) ۹۰ (۱○)</p> <p>(ث) شمارنده‌های اول عدد 14 کدام است؟</p> <p style="text-align: center;">۱, ۲, ۷ (۴○) ۲, ۷, ۱۴ (۳○) ۱, ۲, ۷, ۱۴ (۲○) ۲, ۷ (۱○)</p>	۳
۰/۵	<p>هم‌جهت</p> <p>۱</p> <p>خلاف جهت</p> <p>۰/۵</p>	<p>هر یک از جملات سمت راست را به پاسخ درست سمت چپ وصل کنید.</p> <p>(الف) از قرینه شکل نسبت به یک خط، تصویری به دست می‌آید مساوی و شکل اولیه.</p> <p>(ب) حاصل $\frac{[۳, ۱۰] \div ۶}{(۵, ۱۰)}$ برابر است با</p>	۴

۱/۵	حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.	۵
	الف) $[16 - (-20)] \div (-5 + 1) =$ ب) $[(-72) \div (-9)] + (-14 + 7 - 25) =$	
۱ ۰/۵	الف) عبارت جبری مقابله ساده کنید. ب) در نمودار جبری زیر به جای x مقدار -2 را قرار داده و نمودار را کامل کنید.	۶
۰/۵	دو شکل مقابل همنهشت می‌باشند. تساوی اجزای متناظر خواسته شده را کامل کنید. $\hat{A} = \dots$ $\overline{BC} = \dots$	۷
۰/۵	شکل مقابل را 180° درجه حول نقطه O دوران داده و رسم نمایید. 	۸
۰/۵	ابتدا جمله پنجم و ششم و سپس جمله n ام الگوی زیر را بنویسید. $1, 3, 5, \dots$	۹
۱/۲۵	احمد یک زمین کشاورزی دارد. او $\frac{1}{2}$ آن را پیاز و $\frac{1}{4}$ آن را سبزی و $\frac{1}{8}$ آن را سبز زمینی کاشته است. در چه کسری از این زمین هیچ چیزی کاشته نشده است؟	۱۰
۱/۵	۱۸ دستگاه اتومبیل و موتورسیکلت در یک نمایشگاه قرار دارند. اگر تعداد کل چرخ‌های آنها ۵۸ عدد باشد، چند عدد موتورسیکلت و چند عدد اتومبیل در نمایشگاه وجود دارد؟	۱۱
۱/۲۵	حداقل دمای هوای اردبیل در یک روز پاییزی به 8 درجه زیر صفر و حداکثر به $+6$ درجه می‌رسد. میانگین دما در آن روز چند درجه است؟	۱۲
۱	الف) معادله مقابل را حل کنید. $3x + 5 = 14x - 17$ ب) نازنین برای خرید ۷ مداد و یک دفتر $230\ 000$ تومانی 10000 تومان به فروشنده داد. قیمت هر مداد چقدر است؟	۱۳

زمان آزمون : ۷۵ دقیقه	آزمون نوبت اول	ریاضی
پایه هفتم		آزمون شماره ۱

الف) نادرست (۰/۲۵)؛ اعداد منفی از صفر کوچک‌ترند.	۱
<p>ب) نادرست (۰/۲۵)؛ از دو نقطه، فقط یک خط راست می‌گذرد.</p>  <p>ت) نادرست (۰/۲۵)؛ تنها عدد اول زوج است.</p>	
<p>پ) درست (۰/۲۵)؛ $P = 3 \times a = 3a$ یک ضلع</p> 	
<p>الف) صفر (۰/۲۵)</p> $\frac{1-4a}{2a+1} = \frac{a-1}{2(-1)+1} = \frac{a-1}{-1} = -a$ <p>ب) $-5 - 5 = 0$</p> <p>ت) سه (۰/۲۵)</p> <p>پ) 53°</p>	۲
<p>الف) گزینه «۲» (۰/۲۵)</p> $-[(-14) + 12] = -[(+26)] = -26$ <p>ب) گزینه «۳» (۰/۲۵)؛ چون قسمت حرفی آنها مثل هم است.</p> <p>پ) گزینه «۴» (۰/۲۵)</p> <p>ت) گزینه «۱» (۰/۲۵)؛ زیرا در دوران 90° ساعتگرد وضعیت شکل با دوران 90° پاد ساعتگرد متفاوت است.</p> <p>ث) گزینه «۱» (۰/۲۵)</p>	۳
<p>الف) از گزینه شکل نسبت به یک خط، تصویری به دست می‌آید مساوی و شکل اولیه ← خلاف جهت (۰/۲۵)</p> <p>ب) حاصل $\frac{[3, 10] \div 6}{(5, 10)} = \frac{5}{5} = 1$ برابر است با $\frac{[3, 10] \div 6}{(5, 10)} = \frac{5}{5} = 1$</p>	۴
<p>الف) $[16 - (-20)] \div (-5 + 1) = (+36) \div (-4) = -9$ (۰/۲۵)</p> <p>ب) $[(-72) \div (-9)] + (-14 + 7 - 25) = (+8) + (-32) = -24$ (۰/۷۵)</p>	۵
<p>الف) $-4(2x+2) + 3x + 8 = -8x - 8 + 3x + 8 = -5x$ (۱)</p> <p>ب) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵)</p>	۶
<p>$\hat{A} = \hat{E}$ (۰/۲۵)</p> <p>$\overline{BC} = \overline{HG}$ (۰/۲۵)</p>	۷
<p>می‌توانیم هر رأس را به نقطه O وصل کرده و به همان اندازه در همان راستا حرکت کنیم و نقاط به دست آمده را مانند شکل اصلی به هم وصل کنیم.</p> 	۸
<p>الگو $= 2n - 1$ - شماره عدد n ⇒ جمله n</p> <p>۱ ، ۳ ، ۵ ، ۷ ، ۹ ، ۱۱ ، ... (۰/۲۵)</p>	۹
<p>$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{4+2+1}{8} = \frac{7}{8}$: زمین زیرکشت</p> <p>چیزی کاشته نشده</p>	۱۰

۱۱

از راهبرد حدس و آزمایش استفاده کرده و ابتدا تعداد دوچرخه‌ها و سهچرخه‌ها را ۹ تا حدس می‌زنیم.

موتورسیکلت	اتومبیل	مجموع چرخ‌ها
۹	۹	$9 \times 2 + 9 \times 4 = 54$
۸	۱۰	$8 \times 2 + 10 \times 4 = 56$
۷	۱۱	$7 \times 2 + 11 \times 4 = 58$

پس در این نمایشگاه ۷ موتورسیکلت و ۱۱ اتومبیل وجود دارد. (۱/۵)

۱۲

$$\frac{(-8) + (+6)}{2} = \frac{-2}{2} = -1 \text{ درجه میانگین} \quad (1/25)$$

۱۳

$$3x + 5 = 14x - 17 \Rightarrow 3x - 14x = -5 - 17 \Rightarrow -11x = -22 \Rightarrow x = \frac{-22}{-11} = 2 \quad (\text{الف})$$

$$x = \text{قیمت هر مداد} \rightarrow 7x + 23 = 10000 \Rightarrow 7x = 10000 - 23 \Rightarrow 7x = 7700 \Rightarrow x = \frac{7700}{7} = 1100 \quad (\text{ب})$$

۱۴

$$\begin{cases} \overline{AB} = \overline{EF} \\ \overline{CD} > \overline{EF} \end{cases} \Rightarrow \overline{CD} > \overline{AB} \quad (1/5)$$

۱۵

$$y\hat{O}t = 4^\circ \quad z\hat{O}y = z\hat{O}t - y\hat{O}t = 9^\circ - 4^\circ = 5^\circ \quad x\hat{O}z = x\hat{O}y - z\hat{O}y = 9^\circ - 5^\circ = 4^\circ \quad (1/5)$$

الف) $y = 180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$ و زاویه $x = 125^\circ$ درجه متقابل به رأس هستند. (ب) x و y مکمل هستند. (ب)

۱۶

الف) ابتدا دو عدد را به ضرب شمارنده‌های اول تجزیه می‌کنیم، پس داریم:

$$210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$$

$$135 = 5 \times 3 \times 3 \times 3$$

$$(210, 135) = 3 \times 5 = 15 \quad (1/25)$$

$$[210, 135] = 5 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 7 = 1890 \quad (1/25)$$

$$36 \div 12 = 3 \quad (\text{c})$$

پ) شمارنده‌های مشترک ۴۲ و ۲۸ را مشخص می‌کنیم.

۲۸: شمارنده‌های ۱, ۲, ۴, ۷, ۱۴, ۲۸

۴۲: شمارنده‌های ۱, ۲, ۳, ۶, ۷, ۱۴, ۲۱, ۴۲

۴۲ و ۲۸: شمارنده‌های مشترک ۱, ۲, ۷, ۱۴

پس ضلع این کاشی مربعی می‌تواند ۱, ۲, ۷ و ۱۴ سانتی‌متر باشد. (۱/۲۵)

$$(42, 28) = 14 \quad (1/25)$$

بزرگ‌ترین ضلع مربع، ب.م.م دو عدد ۲۸ و ۴۲ است، بنابراین:

ت) شمارنده‌های اول ۲ و ۵ را به تعداد دلخواه در هم ضرب می‌کنیم تا حاصل از 40° بیشتر شود.

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 = 80 \quad (1/25)$$

$$2 \times 2 \times 5 \times 5 = 100 \quad (1/25)$$

$$2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 = 200 \quad (1/25)$$

۱۷

پ) انتقال (۱/۲۵)

ب) تقارن یا انتقال (۱/۲۵)

الف) دوران (دوران 90° پاد ساعتگرد) (۱/۲۵)



نکته و نسخه ...

مجله ملی کتابخانه های
سینما



فصل اول: راهبردهای حل مسئله

مراحل حل مسئله- روش‌های حل مسئله

حل مسئله یکی از مهارت‌های اساسی در ریاضی است، می‌توان این مهارت را با رعایت نکاتی افزایش داد. در فصل اول این کتاب با مراحل حل مسئله و راهبردهای (روش‌های) حل مسئله آشنا شدیم. یادگرفتید که برای حل کردن هر مسئله باید چهار مرحله ۱- فهمیدن مسئله ۲- انتخاب روش مناسب برای حل مسئله ۳- حل مسئله ۴- بازگشت به عقب و بررسی مجدد را طی کرد. همچنین یادگرفتید که برای حل کردن یک مسئله باید از راهبرد مناسب استفاده کرد. (این راهبردها در نمودار زیر آورده شده‌اند.)



در این فصل مسئله‌های داده شده به صورت چهارگزینه‌ای هستند و برای حل کردن این مسئله‌ها شما باید همان نکات را رعایت کنید. یعنی مسئله را به خوبی بفهمید و با انتخاب راهبرد مناسب به حل آن بپردازید.

توجه: بعضی از مسئله‌ها را می‌توان با چند راهبرد حل کرد. مثلاً ممکن است مسئله‌هایی هم با راهبرد رسم شکل، هم با راهبرد حدس و آزمایش و هم با راهبرد نمادین‌سازی حل شوند.

نکته

▪ معمولاً در حل کردن سؤالات تستی راهبردهایی مانند «**حذف حالت‌های نامطلوب**» و «**حدس و آزمایش**» از جمله راهبردهایی هستند که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بعضی از تست‌ها می‌توان با حذف گزینه‌های نامطلوب (نادرست) به گزینهٔ مطلوب که همان پاسخ مسئله است، برسیم. همچنین بعضی مسئله‌ها را می‌توان با روش «**حدس و آزمایش**» حل کرد، یعنی گزینه‌هایی داده شده را به عنوان حدس، مورد بررسی و آزمایش قرار داد تا حدس درست که همان پاسخ مسئله است به دست آید.

مثال ۱ کدام گزینه می‌تواند اندازه سه زاویه یک مثلث قائم‌الزاویه

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ۱) $40^\circ, 40^\circ, 90^\circ$ | ۲) $100^\circ, 50^\circ, 50^\circ$ |
| ۳) $30^\circ, 90^\circ, 60^\circ$ | ۴) $45^\circ, 90^\circ, 45^\circ$ |

پاسخ: گزینه‌هایی که نامطلوب هستند را حذف می‌کنیم تا به پاسخ درست (مطلوب) برسیم. برای حل این مسئله باید به این نکات توجه کنیم: ۱- مثلث قائم‌الزاویه یک زاویه قائمه دارد. ۲- مثلث متساوی‌الساقین دو زاویه مساوی دارد. ۳- مجموع زاویه‌های هر مثلث 180° است.

بررسی گزینه‌ها:

- (۱) زاویه قائمه نداریم و مجموع زاویه‌ها 200° است، پس نادرست است.
- (۲) مجموع زاویه‌ها 170° است، پس نادرست است.
- (۳) زاویه قائمه داریم، اما دو زاویه مساوی نداریم، پس نادرست است.
- (۴) دو تا از زاویه‌ها مساوی و یکی از آنها قائمه است. همچنین مجموع زاویه‌ها 180° است، پس این گزینه پاسخ درست است.

پاسخ گزینه «۴» است.

مثال ۱ ثلث عددی را با همان عدد جمع کرده‌ایم، حاصل 180 شده است.

- | | | | |
|---------|----------|----------|----------|
| ۱) 10 | ۲) 120 | ۳) 135 | ۴) 150 |
|---------|----------|----------|----------|

پاسخ: ابتدا مسئله را با استفاده از روش نمادین‌سازی می‌نویسیم:

$$\frac{1}{3} \times (\bigcirc + \bigcirc) = 180$$

حالا با استفاده از روش حدس و آزمایش، هر یک از گزینه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

$$1) \frac{1}{3} \times (90 + 90) = 30 + 90 = 120$$

$$2) \frac{1}{3} \times (120 + 120) = 40 + 120 = 160$$

$$3) \frac{1}{3} \times (135 + 135) = 45 + 135 = 180$$

$$4) \frac{1}{3} \times (150 + 150) = 50 + 150 = 200$$

نتیجه اینکه آن عدد، 135 بوده است.

پاسخ گزینه «۳» است.

۸ سگی به گوشه یک باغچه مربع شکل به ضلع ۱۰ متر، با یک طناب ۲۰ متری بسته شده است. اگر سگ و طناب تواند وارد باغچه شود، مساحت ناحیه‌ای که می‌تواند در آن حرکت کند، تقریباً چند متر مربع است؟

$$350\pi \quad 375\pi \quad 175\pi \quad 300\pi$$

۹ چند عدد طبیعی مختلف وجود دارد که حاصل ضرب دو عدد فرد یک رقمی هستند؟

$$13 \quad 14 \quad 15 \quad 25$$

۱۰ با رقم‌های ۶، ۵ و ۴ چند عدد سه رقمی زوج می‌توان نوشت؟

$$9 \quad 18 \quad 12 \quad 10$$

۱۱ با ۴۸ مکعب کوچک، چند مکعب مستطیل مختلف می‌توان ساخت؟

$$7 \quad 10 \quad 9 \quad 8$$

۱۲ یک ترازوی دو کفه و به تعداد کافی وزنه‌های ۳ و ۴ کیلوگرمی در اختیار داریم. به چند طریق می‌توان جسمی به جرم ۶۰ کیلوگرم را با این وزنه‌ها توزین کرد با این شرط که وزنه‌ها فقط در یک کفه ترازو قرار گیرند؟


$$5 \quad 8 \quad 4 \quad 6$$

۱۳ عدد ۴ برابر ۲۰۰۴ بخش‌پذیر و مجموع رقم‌های آن ۶ است. کلاً

چند عدد چهار رقمی وجود دارد که این دو ویژگی را داشته باشند؟

$$18 \quad 14 \quad 13 \quad 12$$

۱۴ یک صفحه هدف به شکل زیر وجود دارد که امتیاز هر ناحیه روی آن نوشته شده است. آرشنده تیر به سمت این صفحه پرتاب می‌کند. اگر هر سه تیر به هدف خورده باشد، مجموع امتیازهای آرشنده چند عدد مختلف می‌تواند باشد؟



$$8 \quad 7 \quad 10 \quad 9$$

۱۵ چند مثلث متساوی الساقین مختلف با طول ضلع طبیعی می‌توان رسم

کرد که محیط آن ۱۷ سانتی‌متر باشد؟

$$7 \quad 5 \quad 4 \quad 6$$

۱۶ چند عدد سه رقمی متقارن داریم؟ (عدد متقارن یعنی عددی که از

هر دو طرف یکسان خوانده شود، مانند ۲۳۲ یا ۴۴۴)

$$99 \quad 90 \quad 81 \quad 72$$

۱۷ توبی از ارتفاع ۳۶ متری سطح زمین رها می‌شود و پس از هر بار به زمین خوردن، ثلث ارتفاع قبلی خود بالا می‌رود. این توب تا زمانی که ۶۵ متر طی کند، چند بار به زمین برخورد خواهد کرد؟

$$4 \quad 3 \quad 2 \quad 1$$

۱۸ بهزاد روز اول نصف پولش را خرج می‌کند. او روز دوم ثلث باقی‌مانده و روز سوم ربع باقی‌مانده پولش از روز قبل را خرج می‌کند. او روز چهارم، $\frac{5}{6}$ از بقیه پولش را خرج می‌کند و ۵۰ تومان برایش باقی ماند. کل پول او چقدر بوده است؟

$$14000 \quad 12000 \quad 10000 \quad 9000$$


۱۹ اگر به هر ضلع مربعی ۴ متر اضافه کنیم، به مساحت آن ۸۸ متر مربع اضافه می‌شود. محیط مربع اولیه چند متر بوده است؟

$$4 \quad 28 \quad 36 \quad 32$$

۲۰ احمد در سفر به شیراز، وقتی اتوبوس نصف مسیر را طی کرده بود، به خواب رفت. وقتی که بیدار شد، مسافت باقی‌مانده نصف مسافتی بود که در طی آن او خوابیده بود. در مدتی که احمد خواب بوده، اتوبوس چه کسری از مسیر خود را طی کرده است؟

$$\frac{2}{3} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{4}$$

۲۱ مطابق شکل زیر یک مثلث و یک دایره می‌توانند حداقل ۶ نقطه تقاطع داشته باشند. یک چهارضلعی و یک مثلث می‌توانند حداقل چند نقطه تقاطع داشته باشند؟



$$5 \quad 4 \quad 8 \quad 6$$

۲۲ کشاورزی همیشه در باغچه خود خیار و گوجه می‌کارد. او امسال یکی از ضلع‌های باغچه مستطیلی کشت گوجه را سه متر جلوتر برد و آن را به مربع تبدیل کرد و در نتیجه باغچه خیار، ۱۵ متر مربع کم شد. مساحت باغچه گوجه قبل از تغییر چند متر مربع بوده است؟

$$5 \quad 9 \quad 10 \quad 15$$

۲۳ جرم یک لیوان پر از آب ۳۰۰ گرم است. اگر $\frac{5}{7}$ آب لیوان را خالی کنیم، جرم لیوان و باقی‌مانده آب ۱۸۰ گرم می‌شود. جرم لیوان خالی چند گرم است؟

$$132 \quad 168 \quad 160 \quad 120$$

نکته و تست پاسخنامه

فصل اول راهبردهای حل مسئله

خرید آنلاین در gajmarket.com


گزینه «۲»

کل مسیر اتوبوس را با یک خط راست نشان می‌دهیم. قبل از خوابیدن احمد، اتوبوس نصف مسیر را طی کرده است. با توجه به شکل بعد از اینکه احمد بیدار می‌شود، $\frac{1}{3}$ از نصف مسیر یعنی $\frac{1}{6}$ مسیر باقی مانده است، پس در مدتی که احمد خواب بوده، اتوبوس $\frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ از مسیر را طی کرده است.




گزینه «۴»

حداکثر نقاط تقاطع وقتی به دست می‌آید که چهارضلعی به صورت مقابل باشد و همچنین مثلث طوری این چهارضلعی را قطع کند که بیشترین نقاط تقاطع به دست آید. بنابراین می‌توانند ۸ نقطه تقاطع داشته باشند.




گزینه «۶»

قسمت کشت گوجه مستطیلی بوده که طول و عرض آن مشخص نیست (مانند شکل (۱)) برای اینکه این مستطیل تبدیل به مربع شود، سه متر به عرض آن اضافه شده است (شکل (۲)) قسمت اضافه شده به شکل یک مستطیل و مساحت آن ۱۵ متر مربع است. پس طول آن یعنی ضلع DC برابر با ۵ متر است. از طرفی DC ضلع مربع جدید است. پس هر ضلع با چهار مربع شکل جدید ۵ مترو مساحت آن $25 = 5 \times 5$ متر مربع است. در نتیجه مساحت با چهار گوجه قبل از تغییر $= 25 - 15 = 10$ متر مربع بوده است.



گزینه «۷»



$$\begin{aligned} \text{گرم لیوان} &= 300 \\ \text{آب} &= \frac{5}{7} \text{ آب} \\ \text{گرم} &= 120 \\ \frac{5}{7} = 120 &\Rightarrow \boxed{\square} = 7 \times 24 = 168 \Rightarrow \text{جم کل آب} = 168 \\ \text{گرم} &= 168 - 180 = 120 \\ \text{گرم لیوان} &= 300 - 120 = 180 \end{aligned}$$

راهبردهای حل مسئله

فصل اول


گزینه «۱»

$$36 + 12 + 12 + 4 + 1 = 65 \text{ متر}$$

فقط ۲ بار به زمین برخورد کرده است.

گزینه «۲»

روش اول: کل پول بهزاد را یک واحد (یک مستطیل) در نظر می‌گیریم. با توجه به شکل زیر، کل پول بهزاد برابر است با:



روش دوم: در حل این گونه مسئله‌ها که هر بار قسمتی از باقیمانده خرج می‌شود، می‌توان با ضرب باقیمانده‌های هر مرحله، باقیمانده نهایی (از کل) را به دست آورد.


$$\frac{1}{24} \text{ پول بهزاد برابر با } 500 \text{ تومان باقی مانده است.}$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$$

$$\text{تومان } 12000 = \frac{500}{\boxed{\square}} \Rightarrow \boxed{\square} = \frac{24 \times 500}{1} = 12000$$

گزینه «۲»

مساحت قسمت رنگی شکل، ۸۸ مترمربع است که از دو مستطیل و یک مربع کوچک تشکیل شده که به مربع اولیه اضافه شده است.



مساحت مربع کوچک $- 88 = 88$ = مجموع مساحت دو مستطیل

$$\text{مترمربع} = 88 - (4 \times 4) = 88 - 16 = 72$$

$$\text{مترمربع} = \frac{72}{3} = 36 \text{ مساحت یک مستطیل} \Rightarrow$$

با توجه به شکل اندازه ضلع مربع اولیه (مربع سفید) با طول مستطیل رنگی برابر است.

$$\text{طول} \times 4 = \text{مساحت یک مستطیل} = 36$$

$$\text{متر} = \frac{36}{4} = 9 \text{ طول مستطیل رنگی} = \text{ضلع مربع اولیه} \Rightarrow$$

$$\text{متر} = 36 = 4 \times 9 = \text{ضلع} \times 4 = \text{محیط مربع اولیه}$$

گزینه «۲»

نکته: شرط تشکیل یک مثلث با سه پاره خط این است که مجموع هر دو پاره خط از پاره خط سوم بیشتر باشد.

دقت کنید که مقدار ضلع‌ها باید عددی طبیعی باشد، کمترین مقدار قاعده می‌تواند ۱ باشد. همچنین مجموع سه ضلع باید مساوی ۱۷ و دو ضلع باید مساوی باشند.

قاعده	ساق	ساق
۱	۸	۸
۳	۷	۷
۵	۶	۶
۷	۵	۵
۹	۴	۴

مثلث تشکیل نمی‌دهند \Rightarrow

پس ۴ مثلث متساوی الساقین مختلف می‌توان رسم کرد.

گزینه «۳»

روش اول: می‌توانیم از کوچک‌ترین عدد متقارن سه رقمی یعنی ۱۰۱ شروع کنیم و از کوچک به بزرگ عده‌های متقارن را بنویسیم. برای اینکه به یک الگوریتم ابتداد عده‌های متقارن بین ۱۰۰ تا ۲۰۰، سپس عده‌های متقارن بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ را نوشتene و به همین ترتیب ادامه می‌دهیم:

ده تا عدد $\Rightarrow ۱۹۱, ۱۱۱, ۱۲۱, \dots, ۱۰۱$

ده تا عدد $\Rightarrow ۲۹۲, ۲۱۲, ۲۲۲, \dots, ۲۰۲$

ده تا عدد $\Rightarrow ۳۹۳, ۳۱۳, ۳۲۳, \dots, ۳۰۳$

$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$

ده تا عدد $\Rightarrow ۹۹۹, ۹۱۹, ۹۲۹, \dots, ۹۰۹$

می‌بینیم که در هر فاصله صد تایی، ده تا عدد متقارن وجود دارد، بنابراین تعداد کل عده‌های سه رقمی متقارن برابر است با:

روش دوم: در عدد متقارن سه رقمی، هر رقمی که در صدگان است باید در یکان هم باشد؛ بنابراین برای صدگان، ۹ انتخاب داریم (رقم صفر نمی‌تواند در صدگان قرار بگیرد) و چون یکان مرتبط با صدگان است، برای یکان یک انتخاب و برای دهگان ۱۰ انتخاب داریم، پس تعداد عده‌های سه رقمی متقارن برابر است با:

$$۹ \times 10 \times 1 = ۹۰$$

حالا تمام عده‌ها را با توجه به دو رقم سمت راست و اینکه مجموع رقم‌ها

باید ۶ باشد، در جدول زیر می‌نویسیم:

دو رقم سمت راست ۰۰ باشد.	۶۰۰۰, ۵۱۰۰, ۴۲۰۰, ۳۳۰۰, ۲۴۰۰, ۱۵۰۰
دو رقم سمت راست ۰۴ باشد.	۱۱۰۴, ۲۰۰۴
دو رقم سمت راست ۱۲ باشد.	۳۰۱۲, ۲۱۱۲, ۱۲۱۲
دو رقم سمت راست ۲۰ باشد.	۴۰۲۰, ۳۱۲۰, ۲۲۲۰, ۱۳۲۰
دو رقم سمت راست ۳۲ باشد.	۱۰۳۲
دو رقم سمت راست ۴۰ باشد.	۲۰۴۰, ۱۱۴۰

بنابراین ۱۸ عدد چهار رقمی وجود دارد که بر ۱۲ بخش پذیر و مجموع رقم‌هایشان ۶ است.

گزینه «۱۴»

این سه تیر به ۱۰ صورت مختلف می‌توانند به هدف بخورند که ۱۰ عدد به عنوان مجموع امتیازها به دست می‌آید. سه تا از این مجموع امتیازها تکراری هستند؛ بنابراین مجموع امتیازهای آرش می‌تواند $7 = 3 + 3 + 4$ باشد.

مجموع امتیازها	امتیاز سومین پرتاب	امتیاز دومین پرتاب	امتیاز اولین پرتاب
۳	۱	۱	۱
۵	۱	۱	۳
۷	۱	۱	۵
۷	۳	۳	۱
۹	۱	۳	۵
۱۱	۱	۵	۵
۹	۳	۳	۳
۱۱	۳	۳	۳
۱۱	۳	۵	۵
۱۳	۳	۵	۵
۱۵	۵	۵	۵

تکراری \rightarrow

تکراری \rightarrow

تکراری \rightarrow